

Quadro 5. Principais ansiolíticos para sintomas agudos de ansiedade*, **, ***

Alprazolam	±11,2	Bupropiona, ciclobenzaprina, furosemida, gabapentina, lisinopril, losartana, omeprazol, trazodona
Bromazepam	±11,2	Antifúngicos, antibióticos macrólidos, inibidores da protease do HIV, agentes bloqueadores dos canais de cálcio
Clonazepam	±35	Aripiprazol, antifúngicos, bupropiona, duloxetina, fluoxetina, fenitoína, ranitidina, fenotiazinas, monoamina oxidase carbamazepina, sertralina, pregabalina, lamotrigina, fenobarbital
Diazepam	±48	Baclofeno, duloxetina, furosemida, cimetidina, lisinopril, omeprazol, prednisona, omeprazol, sertralina
Lorazepam	±18	Aripiprazol, citalopram, duloxetina, escitalopram, pregabalina, bupropiona, sertralina

**Evite o uso com anti-histamínicos, opioides e outros sedativos. Evite o uso em caso de intoxicação alcoólica aguda, glaucoma de ângulo fechado, dependência de drogas, doença renal/hepática, convulsões por depressão respiratória, hipotensão prolongada.*

***Interações medicamentosas e/ou problemas relacionados: Cimetidina, contraceptivos orais contendo estrogênio, diltiazem, dissulfiram, eritromicina, fluoxetina, fluvoxamina, suco de toranja, itraconazol, cetoconazol, nefazodona, propoxifeno, ranitidina e verapamil, que inibem o metabolismo oxidativo dos benzodiazepínicos, têm menos probabilidade de afetar o lorazepam, que sofre conjugação com glicuronídeo.*

****Tome cuidado em casos de depressão, obesidade e na presença de reações paradoxais.*