

Medicamento	Indicação	Nível de Evidência	Observação
Antidepressivos			
ISRS	Adultos com depressão	1	Monitoramento rigoroso nos primeiros 30 dias de uso, especialmente em adolescentes.
Venlafaxina	Adultos e pacientes geriátricos com depressão	1	
Antipsicóticos			
Aripiprazol	Depressão com sintomas psicóticos	5	Como adjuvante aos antidepressivos.
Olanzapina	Esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo ou esquizofreniforme	4	
Clozapina	Esquizofrenia e psicoses esquizofreniformes	1	Comparada à olanzapina e outros agentes.
Risperidona	Esquizofrenia, transtorno esquizoafetivo ou esquizofreniforme	4	
Quetiapina	Depressão bipolar	4	Como adjuvante ao lítio.
Cetamina/Escetamina			
	Transtorno bipolar	4	Uso off-label.
	Transtorno depressivo maior resistente e transtorno depressivo com risco agudo de suicídio	3	Aprovado pela ANVISA para uso intranasal com indicações precisas [16]. Uso intravenoso off-label.
	Transtornos do espectro de humor e ansiedade	4	Sem evidência de melhora sustentada.
Lítio			
	Transtorno bipolar	1	Concentrações terapêuticas. Atenção aos efeitos colaterais. Risco de uso em tentativa de suicídio.
	Transtorno depressivo maior	1	

Quadro 3. Intervenções farmacológicas para o comportamento Suicida
 Legenda: **ISRS** = inibidor seletivo da recaptção de serotonina.