

Tabela 1. Casos de mania/hipomania induzidos pelo aripiprazol relatados na literatura

Autor, data	Casos (n)	Sexo, idade (anos)	Diagnóstico principal	Dose (mg/dia)	Início dos sintomas
Barnas, Hussain e Petrides, 2005 [5]	1	feminino, 57	transtorno esquizoafetivo	20	2 semanas
Traber, Schneider e Modestin, 2007 [6]	1	masculino, 35	esquizofrenia paranoide	15	10 dias
Padala, Wengel e Petty, 2007 [7]	1	feminino, 45	transtorno esquizoafetivo	10	3 dias
Ducroix et al., 2008 [8]	1	masculino, NR	transtorno esquizoafetivo	15	NR
Donohue, 2010 [9]	1	masculino, 55	TDM + TOC + TAG	5	NR
Souza, Santos e Moreno, 2010 [10]	3	masculino, 41	depressão bipolar (TAB I) + TOC	60	NR
		masculino, 30	depressão bipolar (TAB II)	15	20 dias
		masculino, 51	depressão bipolar (TAB II)	7,5	NR
Viikki, Valtonen e Leinonen, 2011 [11]	4	feminino, 46	TDM	5	1 semana
		masculino, 44	depressão bipolar (TAB II)	7,5	3 semanas
		masculino, 39	depressão bipolar (TAB II)	15	2 semanas
		feminino, 19	episódio misto (TAB I)	7,5	4 semanas

NR: não relatado; **TDM:** transtorno depressivo maior; **TOC:** transtorno obsessivo-compulsivo;

TAG: transtorno de ansiedade generalizada; **TAB I:** transtorno afetivo bipolar, tipo I; **TAB II:** transtorno afetivo bipolar, tipo II