

**Quadro 3.** Distribuição das variáveis de acordo com os níveis avaliados pelo BDI

<b>Variável</b>	<b>Nível Mínimo n(%)</b>	<b>Nível Leve n(%)</b>	<b>Nível Moderado n(%)</b>	<b>Nível Grave n(%)</b>	<b>p</b>
<b>Sexo</b>					
Masculino	54 (57,4)	22 (61,1)	24 (52,2)	9 (33,3)	0,115
Feminino	40 (42,6)	14 (38,9)	22 (47,8)	18 (66,7)	
<b>Etnia</b>					
Caucasiano	76 (80,9)	32 (88,9)	39 (84,8)	20 (74,1)	0,445
Não Caucasiano	18 (19,1)	4 (11,1)	7 (15,2)	7 (25,9)	
<b>Estado Civil</b>					
Casado	32 (34,0)	13 (36,1)	17 (37,0)	4 (14,8)	0,759
Divorciado	6 (6,4)	1 (2,8)	3 (6,5)	2 (7,4)	
Não Informado	-	-	-	1 (3,7)	
Separado	3 (3,2)	1 (2,8)	3 (6,5)	1 (3,7)	
Solteiro	45 (47,9)	18 (50,0)	20 (43,5)	16 (59,3)	
Viúvo	8 (8,5)	3 (8,3)	3 (6,5)	3 (11,1)	
<b>Renda Familiar</b>					
1-3 Salários Mínimos	65 (69,1)	20 (55,6)	31 (67,4)	19 (70,4)	0,694
< 1 Salários Mínimos	12 (12,8)	6 (16,7)	7 (15,2)	6 (22,2)	
>3 Salários Mínimos	14 (14,9)	9 (25,0)	5 (10,9)	2 (7,4)	
Não Informado	3 (3,2)	1 (2,8)	3 (6,5)	-	
<b>Grau de Instrução</b>					
Analfabeto	-	-	-	1 (3,7)	0,006
Não Informado	3 (3,2)	-	3 (6,5)	-	
1º Grau Completo	24 (25,5)	7 (19,4)	11 (23,9)	11 (40,7)	
1º Grau Incompleto	28 (29,8)	12 (33,3)	16 (34,8)	10 (37,0)	
2º Grau Completo	25 (26,6)	8 (22,2)	7 (15,2)	3 (11,1)	
2º Grau Incompleto	5 (5,3)	-	5 (10,9)	1 (3,7)	
Superior Completo	6 (6,4)	9 (25,0)	1 (2,2)	1 (3,7)	
Superior Incompleto	3 (3,2)	-	3 (6,5)	-	
<b>Ponto de Corte TCD4<sup>+</sup></b>					
< 200 células/mm <sup>3</sup>	26 (27,7)	17 (47,2)	12 (26,1)	7 (25,9)	0,140
≥ 200 células/mm <sup>3</sup>	68 (72,3)	19 (52,7)	34 (73,9)	20 (74,4)	
<b>Carga Viral</b>					
≤ 50 cópias/ml	63 (67,0)	23 (63,9)	26 (56,5)	17 (63,0)	0,691
> 50 cópias/ml	31 (33,0)	13 (36,1)	20 (43,5)	10 (37,0)	
<b>Fase da Doença</b>					
Fase 1	49 (52,1)	12 (33,3)	21 (45,7)	11 (40,7)	0,651
Fase 2	35 (37,2)	16 (44,4)	20 (43,5)	13 (48,1)	
Fase 3	10 (10,6)	8 (22,2)	5 (10,9)	3 (11,1)	
<b>Uso de Antirretrovirais</b>					
Não	19 (20,2)	9 (25,0)	11 (23,9)	10 (37,0)	0,382
Sim	75 (79,8)	27 (75,0)	35 (76,1)	17 (63,0)	
<b>Uso de Medicação Psiquiátrica</b>					
Não	83 (88,3)	29 (80,6)	22 (47,8)	12 (44,4)	0,000
Sim	11 (11,7)	7 (19,4)	24 (52,2)	15 (55,6)	

<b>Uso de Outras</b>					
<b>Medicações</b>	61 (64,9)	23 (63,9)	30 (65,2)	13 (48,1)	0,494
Não	2 (2,1)	-	1 (2,2)	-	
Não Informado	31 (33,0)	13 (36,1)	15 (32,6)	14 (51,9)	
Sim					
<b>Uso Abusivo de</b>					
<b>Substâncias</b>	85 (90,4)	31 (86,1)	38 (82,6)	22 (81,5)	0,486
Não	9 (9,6)	5 (13,9)	8 (17,4)	5 (18,5)	
Sim					
<b>Antipsicóticos</b>					
Não	91 (98,9)	34 (100)	37 (90,2)	23 (92,0)	0,032
Sim	1 (1,1)	-	4 (9,8)	2 (8,0)	
<b>Antidepressivo</b>					
Não	88 (95,7)	32 (94,1)	29 (70,7)	17 (68,0)	0,000
Sim	4 (4,3)	2 (5,9)	12 (29,3)	8 (32,0)	
<b>Benzodiazepínico</b>					
Não	85 (92,4)	30 (88,2)	29 (70,7)	16 (64,0)	0,002
Sim	7 (7,6)	4 (11,8)	12 (29,3)	9 (36,0)	
<b>Estabilizador de Humor</b>					
Não	91 (98,9)	34 (100)	40 (97,6)	24 (96,0)	0,517
Sim	1 (1,1)	-	1 (2,4)	1 (4,0)	

Fonte: Dal-Bó.