

Quadro 2. Descrição dos artigos incluídos na revisão integrativa

#N	Autores e Ano	País de origem do caso	Objetivo	Grupo amostral	Hipótese explicativa adotada
01	Schroeter et al. (2020) [18]	Alemanha	Identificar correlatos neurais da SC na Atrofia Cortical Posterior (PCA) via neuroimagem avançada.	Mulher, 57 anos, com PCA/Doença de Alzheimer.	Neuroanatômica/Estrutural: Atrofia em regiões específicas do giro do cíngulo posterior e giro frontal médio.
02	Watanabe et al. (2024) [19]	Japão	Descrever a SC como sintoma de apresentação da Demência por Corpos de Lewy (DLB).	Mulher, 74 anos, com DLB.	Neurodegenerativa: A SC é um sintoma indicativo de DLB.
03	Ben Ammar et al. (2021) [20]	Tunísia	Analisar um caso de filicídio motivado pela SC em transtorno esquizoafetivo.	Mulher, 35 anos, transtorno esquizoafetivo.	Psicodinâmica/Risco de Violência: A SC como fator de risco específico para impulso homicida contra o alvo do delírio.
04	Revilla et al. (2021) [21]	Peru	Relatar a coexistência rara das Síndromes de Cotard e Capgras em esquizofrenia resistente.	Homem, 23 anos, esquizofrenia resistente.	Inferencial: Anomalia perceptiva seguida de racionalização anormal; Capgras como externalização de eventos negativos.
05	O'Brien et al. (2023) [22]	Irlanda	Relatar a coexistência de delírios de Capgras e vampirismo em esquizofrenia resistente e resposta à clozapina.	Homem, 15 anos, com esquizofrenia.	Integrativa (Sensorial-Inferencial): Prejuízo no processamento sensorial combinado com falha na avaliação de crenças.
06	Castro et al. (2022) [23]	Colômbia	Relatar a SC como desencadeada pelo uso de cannabis.	Homem, 28 anos, uso crônico de cannabis.	Orgânica/Induzida por Substância: Uso de canabinoides como gatilho provável.
07	Shaw et al.	Reino Unido	Descrever uma variante exclusivamente auditiva da SC em primeiro episódio psicótico.	Mulher, 70 anos, primeiro episódio psicótico.	Neuropsicológica Multimodal: Déficits em vias sensoriais não-visuais (auditivas) podem causar a síndrome.



#N	Autores e Ano	País de origem do caso	Objetivo	Grupo amostral	Hipótese explicativa adotada
	(2024) [24]				
08	Quarenta et al. (2022) [25]	Portugal	Descrever um caso de "Síndrome dos Duplos Subjetivos" em primeiro episódio psicótico com uso de cannabis.	Homem, 30 anos, primeiro episódio psicótico.	Neurofuncional: Hiperatividade do córtex perirrinal (hiperfamiliaridade) e disfunção frontal.
09	Connors et al. (2024) [26]	Austrália	Relatar um caso de Delírio de Fregoli em psicose pós-parto para discutir sua gênese.	Mulher, 30 anos, psicose pós-parto.	Cognitiva/Modelo de Crenças: Paranoia primária levando à hiperatividade de "nós de identidade".
10	Ghannadi et al. (2024) [27]	Irã	Relatar um caso complexo de Delírio de Fregoli associado a trauma e uso de substâncias.	Homem, 23 anos.	Psicodinâmica/Trauma: Trauma como fator contribuinte significativo para alterações perceptivas e delirantes.
11	Gramling et al. (2024) [28]	EUA	Destacar a associação da SC com Lesão Cerebral Traumática (TCE) e a resposta à olanzapina.	Homem, 39 anos, com histórico de TCE.	Neuroestrutural: Desconexão entre lobo temporal e sistema límbico devido a lesão (encefalomalacia frontal).

Fonte: Os autores

Legenda: **#N:** Número de identificação do artigo na revisão. **DLB:** Demência por Corpos de Lewy. **PCA:** Atrofia Cortical Posterior. **SC:** Síndrome de Capgras. **TCE:** Traumatismo Cranioencefálico.