

Quadro 1. Dados sociodemográficos e clínicos associados à ideação suicida nos últimos 12 meses

Ideação suicida nos últimos 12 meses					
Variável	≠N	*ORb (IC 95%)	P	*ORa (IC 95%)	p
Gênero					
Masculino (Ref.)	76				
Feminino	119	1,27 (0,65-2,5)	0,478	-	-
Idade					
18 ≤ 24	179				
≥25	17	0,17 (0,022-1,32)	0,090	0,11 (0,01-1,03)	0,054
Orientação Sexual					
Heterossexual (Ref.)	151				
LGBTQIA+	45	1,71 (0,83-3,56)	0,144	1.05 (0,45-2,44)	0,909
Procedência					
Recife (Ref.)	117				
Demais regiões	79	1,15 (0,598-2,21)	0,674	-	-
Raça					
Branco (Ref.)	138				
Pardo	50	0,59 (0,26-1,34)	0,210	-	-
Período					
Ciclo Básico (Ref.)	72				
Ciclo Clínico	93	0,58	0,143	0,74	0,484

		(0,28-1,20)		(0,32-1,69)	
Internato	31	1,15 (0,46-2,86)	0,754	1,6 (0,54-4,74)	0,395
Moradia					
Conjunta (Ref.)	171				
Sozinho	25	0,94 (0,35-2,50)	0,902	-	-
ASSIST					
Risco baixo (Ref.)	170				
Risco Médio-Alto	26	1,72 (0,71-4,15)	0,228	-	-
Ansiedade					
Não (Ref.)	108				
Sim	88	3,9 (1,95-7,8)	<0,001	1,91 (0,82-4,42)	0,130
Depressão					
Não (Ref.)	130				
Sim	66	8,146 (3,95-16,78)	<0,001	6,3 (2,75-14,38)	<0,001

Fonte: Os autores.

Legenda: Regressão logística simples; Regressão logística múltipla. $p < 0,05$;
 ***ORb:** odds ratio bruto; **ORa:** odds ratio ajustado; 95%IC: 95% intervalo de confiança; †(Ref.): Nível de referência da variável; ‡N%: Número total de indivíduos por variável