

Tabela 1. Características da amostra e frequências de diagnósticos principais e comorbidades

Variáveis	Frequência (%)
Idade (anos, M=14,16; DP=1,95)	
1-4	0(0)
5-9	7(3,2)
10-14	108(49,5)
15-18	103(47,2)
Sexo	
Masculino	88(40,4)
Feminino	130(59,7)
Domicílio	
Interior	207(94,9)
Metrópole	10(4,6)
Rural	1(0,4)
Sem informação	0(0)
Antecedentes Familiares Psiquiátricos	
Sim	117(53,7)
Não	29(13,3)
Sem informação	72(33,0)
Reinternações (N= 67)	
Sim	45(20,6)
Não	173(79,3)
Modalidade de alta por internação	
Médica	238 (83,5)
A pedido	41(14,4)
Evasão	6 (2,1)
Tempo internação (dias, M=14,43; DP=16,08)	
0-7	109 (38,2)
8-15	53(18,6)
16-30	58(20,3)
31-60	28(9,8)
61-90	6(2,1)
91-180	1(0,3)
Sem informação	30(10,5)
Convênio	
SUS	176 (80,7)
Plano de saúde	37(17,0)
Particular	5(2,3)

	Diagnóstico principal		Comorbidade	
	f	%	f	%
T. Bipolar	67	30,7	1	0,4
T. Neurocognitivo	6	2,7	-	-
T. Disruptivos do Comportamento	34	15,6	2	0,9
T. de Déficit de Atenção e Hiperatividade	7	3,2	4	1,8
T. Relacionado à Substância	30	13,8	8	3,7
T. Depressivo	50	22,9	-	-
Esquizofrenia	5	2,3	-	-
T. Psicóticos	12	5,5	-	-
T. do Espectro Autista	14	6,4	-	-
Deficiência Intelectual	23	10,5	1	0,4
T. Personalidade	11	5,0	-	-
T. Ansiedade	10	4,6	1	0,4
T. Dissociativos	-	-	-	-
T. Controle dos Impulsos	2	0,9	-	-
T. Alimentar	1	0,4	-	-
T. Obsessivo-compulsivo	1	0,4	-	-
T. Relacionado a trauma e estressores	10	4,6	-	-
T. Sono	-	-	-	-
T. Sexual	-	-	-	-
Epilepsia	-	-	3	1,4
Sem informação	10	4,6	199	91,3

Fonte: Os autores.

Nota: Teste usado: Qui-quadrado.

Legenda: **M** = Média; **DP** = desvio-padrão; **f** = frequência absoluta; **%** = valor percentual.