

Tabela 2. Frequência de diagnósticos por sexo

Variável	Masculino n (%)	Feminino n (%)	p-valor
T. Bipolar	24 (27,3)	43 (33,1)	0,446
T. Neurocognitivo	3 (3,4)	3 (2,3)	0,948
T. Relacionado à Substância	23 (26,1)	7 (5,4)	<0,001*
T. Disruptivos do Comportamento	25 (28,4)	10 (7,7)	<0,001*
T. de Déficit de Atenção e Hiperatividade	6 (6,8)	1 (0,8)	0,036*
T. Depressivo	5 (5,7)	46 (35,4)	<0,001*
Deficiência Intelectual	11 (12,5)	12 (9,2)	0,585
Esquizofrenia	2 (2,3)	3 (2,3)	1,000
T. Psicóticos	6 (6,8)	6 (4,6)	0,691
T. Personalidade	0 (0,0)	12 (9,2)	0,009*
T. do Espectro Autista	12 (13,6)	2 (1,5)	0,001*
T. Ansiedade	5 (5,7)	5 (3,8)	0,760
T. Alimentar	0 (0,0)	1 (0,8)	1,000
T. Controle dos Impulsos	1 (1,1)	1 (0,8)	1,000
Epilepsia	1 (1,1)	2 (1,5)	1,000
T. Obsessivo-compulsivo	1 (1,1)	0 (0,0)	0,844
T. Relacionado a trauma e estressores	3 (3,4)	7 (5,4)	0,723

Fonte: Os autores.

Nota: Teste usado: Qui-quadrado.

Legenda: f = frequência absoluta; % = valor percentual; * significativo.