

Tabela 3. Características da amostra e frequência de diagnósticos por faixa etária

Variáveis	Idade (Frequência(%))				p
	1-4 (n=0)	5-9 (n=7)	10-14 (n=108)	15-18 (n=103)	
Sexo					0,045*
Masculino	0 (0,0%)	8 (38,1%)	21 (36,2%)	56 (54,4%)	
Feminino	0 (0,0%)	13 (61,9%)	37 (63,8%)	47 (45,6%)	
Antecedentes familiares psiquiátricos					0,145
Sim	0 (0,0%)	10 (47,6%)	33 (56,9%)	58 (56,3%)	
Não	0 (0,0%)	11 (52,4%)	25 (43,1%)	45 (43,7%)	
Diagnósticos					
T. Bipolar	0 (0,0%)	4 (19,0%)	11 (19,0%)	31 (30,1%)	0,969
T. Neurocognitivo	0 (0,0%)	5 (23,8%)	1 (1,7%)	0 (0,0%)	0,020*
T. Relacionado à Substância	0 (0,0%)	0 (0,0%)	3 (5,2%)	21 (20,4%)	0,024*
T. Disruptivos do Comportamento	0 (0,0%)	6 (28,6%)	13 (22,4%)	17 (16,5%)	0,448
Déficit Atencional e Hiperatividade	0 (0,0%)	9 (42,9%)	31 (53,4%)	27 (26,2%)	0,004*
T. Depressivo	0 (0,0%)	2 (9,5%)	16 (27,6%)	63 (61,2%)	<0,001*
Deficiência Intelectual	0 (0,0%)	3 (14,3%)	11 (19,0%)	44 (42,7%)	0,021*
Esquizofrenia	0 (0,0%)	0 (0,0%)	2 (3,4%)	23 (22,3%)	<0,001*
T. Psicóticos	0 (0,0%)	0 (0,0%)	3 (5,2%)	45 (43,7%)	<0,001*
T. Personalidade	0 (0,0%)	0 (0,0%)	7 (12,1%)	24 (23,3%)	0,033*
T. do Espectro Autista	0 (0,0%)	4 (19,0%)	9 (15,5%)	2 (1,9%)	0,001*
T. Ansiedade	0 (0,0%)	5 (23,8%)	14 (24,1%)	31 (30,1%)	0,765
T. Alimentar	0 (0,0%)	0 (0,0%)	2 (3,4%)	6 (5,8%)	0,537
T. Controle dos Impulsos	0 (0,0%)	2 (9,5%)	6 (10,3%)	5 (4,9%)	0,441
Epilepsia	0 (0,0%)	2 (9,5%)	6 (10,3%)	7 (6,8%)	0,713
T. Obsessivo-compulsivo	0 (0,0%)	1 (4,8%)	4 (6,9%)	6 (5,8%)	0,921
T. Relacionado a trauma e estressores	0 (0,0%)	3 (14,3%)	8 (13,8%)	18 (17,5%)	0,874

Fonte: Os autores.**Nota:** Teste usado: Qui-quadrado.**Legenda:** f = frequência absoluta; % = valor percentual; * significativo.